

Plantes des « zones à fauche tardive » du « Grand Pâtural » à Longeville-lès-Metz (inventaire 2020)

Tableau : relevé floristique en 2020 sur le site du « Grand Pâtural » à LONGEVILLE-lès-Metz (57) - (par M. Renner)				
Abréviations : RR : très rare ; z2 : ZNIEFF 2 ; (H) = plante des zones humides ; i = plante « invasive » ; E = « exogène » ; fréq. = fréquence				
Milieu du relevé : zones non fauchées (pratique de la fauche tardive) des pelouses du « Grand Pâtural »				
Dates du relevé : 01/10/2020, compléments les 06 et 13/10 + compléments sur photos faites par Raphaël Jannot, en juin et septembre 2020				

* Statut : pour la fréquence, référence « <i>Flora lotharingia : Flore de Lorraine et des contrées limitrophes</i> » (Floraine, 2020. Ed. : Gazette Lorraine, 540 p.) ; pour autre, référence « <i>Atlas de la flore lorraine</i> » (Floraine, 2013) et BONASSI J. (coord.), 2015.- Inventaire de la flore vasculaire de Lorraine : indigénats, raretés, menaces, protections. <i>Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la France</i> , 13 : 3-43.				
* Noms scientifiques / communs : réf., « <i>Flora lotharingia</i> » et/ou « <i>Atlas de la flore lorraine</i> », ou « <i>Nouvelle Flore de Lorraine</i> » (VERNIER, 2001)				
* Nota : Les plantes sans indice de fréquence (dans colonne « Statut ») sont : « extrêmement communes », « très communes », « communes » ou « assez communes ».				
* inventaire non exhaustif mais presque pour la période.				
ESPECES		Statut		Remarques
Nom scientifique	Nom commun	fréq.	autre	
PLANTES HERBACEES				
Poaceae (Graminées) :				
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Avoine élevée			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle aggloméré			
<i>Elytrigia repens</i>	Petit chiendent			
<i>Festuca arundinacea</i>	Fétuque faux roseau			en juin
<i>Festuca pratensis</i>	Fétuque des prés			
<i>Lolium perenne</i>	Ray-grass commun			
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	Pâturin des prés			
<i>Phleum pratense</i>	Phléole des prés			
<i>Roegneria canina</i>	Chiendent des chiens			
<i>Triticum</i> sp.	Blé sp.			2 pieds
Cypéracées (Carex, Scirpes,...) :				
<i>Carex hirta</i>	Laîche hérissée		(H)	
Autres herbacées :				
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée			
<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i>	Ballote fétide			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette			
<i>Centaurea jacea</i> *	Centaurée jacée			* subsp. ?
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs			
<i>Crepis biennis</i>	Crépide bisannuelle			
<i>Daucus carota</i>	Carotte			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage			
<i>Epilobium tetragonum</i>	Epilobe à quatre angles		(H)	
<i>Erigeron canadensis</i> *	Vergerette du Canada		i ; E	* = <i>Conyza canadensis</i>
<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium à feuilles de ciguë			dans zones rases
<i>Galium mollugo</i>	Caille-lait blanc			
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées			jeunes pousses
<i>Geranium</i> sp.	Géranium sp.			jeunes pousses
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé			en juin
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée			
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole			

<i>Linaria vulgaris</i>	Linaires commune			
<i>Lipandra polysperma</i> *	Chénopode lipandre			* = <i>Chenopodium polyspernum</i>
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve des bois			
<i>Matricaria chamomilla</i> *	Matricaire camomille			* = <i>M. recutita</i>
<i>Medicago arabica</i>	Luzerne tachée ; L. d'Arabie			
<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	Luzerne cultivée			
<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i>	Luzerne à fruit en faux			
<i>Medicago x varia</i>	Luzerne hybride			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle			dans zones perturbées
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun			en juin
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand coquelicot			en juin
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé			
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i>	Plantain majeur ; Grand p.			
<i>Plantago media</i>	Plantain bâtard ; P. moyen			
<i>Polygonum aviculare</i>	Renouée des oiseaux			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante		(H)	
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue			
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à f. obtuses			
<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> *	Liondent d'automne			* = <i>Leontodon autumnalis</i>
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap		i	
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Compagnon blanc			
<i>Silene vulgaris</i>	Silene commun			1 touffe
<i>Stellaria media</i>	Mouron des oiseaux			
<i>Taraxacum sp.</i>	Pissenlit sp.			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc			
<i>Verbascum pulverulentum</i>	Molène pulvérulente	RR	z2	pas rare en région messine
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon-blanc			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale			
PLANTES LIGNEUSES				
(arbres, arbustes, arbrisseaux, sous-arbr., lianes)				
<i>Clématitis vitalba</i>	Clématite vigne-blanche			jeune pousse près d'un arbre
<i>Rosa canina</i> (groupe)	Rosier des chiens (gr.)			jeune pousse

Bilan : Total 66 taxons dont :

- 64 plantes herbacées (10 Poacées, 1 Carex, 53 autres herbacées)
- 2 plantes ligneuses

Parmi ces plantes : 1 plante « très rare » en Lorraine (de ZNIEFF 2) ; 3 plantes des « zones humides » (H).

Nota :

2 plantes « invasives » relevées : *Erigeron canadensis* (Vergerette du Canada) ; *Senecio inaequidens* (Séneçon du Cap)